

Virusul hepatitic A, care se transmite prin nespălarea mâinilor și apă contaminată și care "a stat cumințe" ani în șir, vine acum pe piața medicală cu afectări severe și, combinat cu virusurile hepatitice B și C, poate să genereze "forme fulminante de boală", a declarat Adrian Streinu-Cercel.

"Virusul A, care a stat cumințe ani în șir, acum este reemergent și vine pe piața medicală cu afectări severe, respectiv cu nivele mari ale enzimelor hepatice, de 4.000 de unități, față de normal -40-50 unități internaționale - și asociată cu o componentă colestatică (...). Mai mult, când aceasta vine peste o hepatită cu virus B și C, poate să genereze forme fulminante de hepatită, care nu era treaba virusului hepatitic A. Virusul hepatitic A își modifică modul de interacțiune cu organismul uman, iar aceste forme fulminante sunt și cele care necesită protezare hepatică, respectiv așa-zisul ficat artificial", a explicat doctorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, la conferința de presă dedicată Zilei Internaționale de Luptă împotriva Hepatitei, organizată de MEDIAFAX, în parteneriat cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO).

Potrivit medicului, atât virusul hepatitic A, cât și E sunt virusuri care se transmit pe cale fecal-orală, adică prin mâini murdare și apă contaminată. Celelalte virusuri hepatitice, respectiv B, C și D, se transmit prin sânge și prin act sexual neprotejat.

"Când vorbim de hepatita A, vorbim de igienă și de comportament în societate. Un lucru foarte important, această boală poate fi prevenită prin vaccinare", a mai spus Streinu-Cercel.

La conferința de presă organizată de MEDIAFAX în parteneriat cu APAH-RO și dedicată Zilei Internaționale de Luptă împotriva Hepatitei, marcată în toată lumea în 28 iulie, au fost abordate teme de interes precum: strategia privind prevenția și diagnosticarea precoce a hepatitei, accesul pacienților cu hepatită la tehnici terapeutice și tratamente de ultimă generație, programul de transplant hepatic în România, rolul medicului de familie pentru pacienții cu boli hepatice și pentru societate, medicamentele destinate hepatitei care se vor regăsi pe lista de compensate și gratuite.

Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, circa 1,4 milioane de persoane se îmbolnăvesc anual de hepatita A, 240 de milioane suferă de hepatită de tip B, iar 150 de milioane au contractat virusul hepatic C. La nivel mondial, hepatita ucide în fiecare an circa 1,4

Written by Administrator

Tuesday, 29 July 2014 04:21 - Last Updated Sunday, 03 August 2014 11:57

milioane de persoane şi afectează alte sute de mii de persoane.

Se estimează că în România sunt 10 la sută dintre cei 12 milioane de bolnavi de hepatită C care ar fi în Europa. Alarmant este faptul că specialiştii prognozează un vârf al incidenţei hepatitei în 2020, în urma cumulului obţinut între pacienţii infectaţi înainte de anul 1989 cu persoanele nou infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje.

Potrivit celui mai recent raport lansat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA), România se situează pe ultimul loc din 30 de state europene în ceea ce priveşte accesul pacienţilor cu hepatită la tratament şi servicii medicale specializate.

Mediafax