

Cancerul de col uterin și celelalte afecțiuni asociate cu virusul HPV sunt probleme de sănătate publică mondială, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care insistă asupra necesității includerii vaccinului împotriva HPV în programele naționale de imunizare.

OMS precizează că recunoaște importanța cancerului de col uterin și a altor afecțiuni asociate cu HPV ca fiind probleme de sănătate publică mondiale și reiterează recomandarea ca vaccinul anti-HPV să fie inclus în programele naționale de imunizare, cu condițiile ca prevenirea cancerului de col uterin și/sau a altor boli cauzate de HPV să fie o prioritate de sănătate publică, introducerea vaccinului să fie fezabilă programatic, să poată fi asigurată o finanțare sustenabilă și să fie luate în considerare strategiile de eficiență a costurilor vaccinării în țară sau regiune.

"Atât vaccinul anti-HPV tetravalent, cât și cel bivalent au profiluri de siguranță și eficacitate excelente. Ele trebuie introduse ca parte a unei strategii coordonate și complete de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli cauzate de HPV. Această strategie trebuie să includă o educare cu privire la reducerea comportamentelor care cresc riscul de dobândire a infecției cu HPV, instruirea agenților de sănătate și informarea femeilor despre depistarea, diagnosticarea și tratamentul leziunilor precanceroase și cancerului", arată OMS.

Strategia ar trebui să includă, potrivit OMS, și acces crescut la servicii de depistare terapeutice de calitate, la tratamentul cancerelor invazive și îngrijiri paliative.

În opinia organizației, introducerea vaccinului anti-HPV nu ar trebui să submineze finanțarea pentru dezvoltarea sau întreținerea programelor eficiente de depistare a cancerului de col uterin, vaccinarea fiind un instrument primar de prevenire care nu elimină necesitatea depistărilor ulterioare, din moment ce vaccinurile nu protejează împotriva tuturor tipurilor HPV cu risc ridicat.

OMS susține că trebuie căutate oportunități pentru a asocia introducerea vaccinului anti-HPV cu alte programe pentru tineri (de exemplu prin serviciile de sănătate pentru adolescenți), dar arată că introducerea vaccinării anti-HPV nu trebuie amânată, din cauza faptului că alte intervenții relevante nu pot fi implementate în același timp.

Potrivit OMS, vaccinurile anti-HPV au fost omologate pe baza eficienței lor clinice demonstrate la femeile tinere și, numai pentru vaccinul tetravalent, la bărbații tineri.

"Comitetul Consultativ Global pentru Siguranța Vaccinurilor (GACVS) al OMS a revizuit în mod regulat datele despre siguranța vaccinurilor anti-HPV. Comitetul a revizuit și datele de supraveghere post-autorizație din Statele Unite, Australia, Japonia și producători. Datele din toate sursele continuă să fie pozitive în ceea ce privește siguranța ambelor vaccinuri. GACVS a concluzionat în martie 2014 că ambele vaccinuri anti-HPV continuă să aibă un profil de siguranță excelent", se arată în raportul OMS.

În urma vaccinării pot să apară reacții locale, respectiv durere la locul injecției, raportată de până la 80 la sută din persoanele vaccinate cu vaccinurile tetravalent și bivalent, sau durere severă (durere spontană sau durere care a împiedicat desfășurarea unei activități normale), raportată de aproximativ șase la sută din persoanele vaccinate.

"O analiză a dovezilor privind siguranța vaccinurilor anti-HPV a concluzionat că ambele vaccinuri sunt asociate cu rate relativ ridicate ale reacțiilor la locul injecției, în special durere, însă acestea sunt de obicei de scurtă durată și se rezolvă spontan", arată specialiștii.

OMS notează că unele studii din țările cu venituri ridicate au raportat că vaccinarea adolescenților pentru prevenirea cancerului cervical ar putea fi eficientă din punct de vedere al costurilor, dacă acoperirea vaccinală la fete este ridicată.

"Totuși, majoritatea analizelor din țările cu venituri ridicate indică faptul că extinderea la băieți nu este eficientă decât dacă acoperirea vaccinului la femei este scăzută și/sau prețul vaccinului este foarte scăzut", se mai arată într-un raport OMS.